



**ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Α.Ε.**  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ

# Κατάλογος Προϊόντων







*Κατάλογος*

Προϊόντων

# Ποικιλίες Βαμβακιού



**1** DP 396

**2** DP 419

**3** DP 401





**ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΡΩΤΗΣ Α.Ε.**  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΡΑΣ

ΦΥΤΑ/ΜΕΤΡΟ	ΦΥΤΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ	ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ/ΣΑΚΙ
14	14584	14
16	16667	12
18	18750	11
20	20833	10
22	22916	9
24	25000	8
26	27083	7

### DP 396

- Πρώιμη ποικιλία.
- Εύκολη στη διαχείριση.
- Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη.
- Πολύ παραγωγική με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιματικών συνθηκών.
- Ικανοποιητική ανοχή στην αδρομύκωση.
- Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε προσβολές από ιασσίδες λόγω του τριχωτού φυλλώματος.
- Ισορροπημένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας.
- Συνιστώμενη πυκνότητα φυτείας 16 έως 18 φυτά / μέτρο.

### DP 419

- Μεσοπρώιμη ποικιλία.
- Εύκολη διαχείριση και εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη.
- Εξαιρετική προσαρμοστικότητα.
- Κορυφαία απόδοση σε σύσπορο.
- Πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα στο εκκοκκιστήριο.
- Άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας.
- Συνιστώμενη πυκνότητα φυτείας 16 έως 18 φυτά / μέτρο.

### DP 401

- Μεσοπρώιμη ποικιλία με καθορισμένο τρόπο ανπαυξης.
- Εύκολη στη διαχείριση.
- Μέγεθος φυτού μεσαίο.
- Πολύ καλές παραγωγές συσπόρου με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες
- Η υψηλή της ανοχή στην αδρομύκωση και η πρωιμότητα της, την καθιστούν σαν μοναδική ίσως ποικιλία από τις καλλιεργούμενες στην Ελλάδα.
- Παραμένει πράσινη έως τη συγκομιδή με καλή αντίδραση στα αποφυλλωτικά.
- Πολύ ικανοποιητικά χαρακτηριστικά ίνας.
- Συνιστώμενη πυκνότητα φυτείας 16 έως 18 φυτά / μέτρο.

# Υβρίδια Καλαμποκιού

**AMERICAN  
genetics**



**1**

**AGN 430**

**2**

**AGN 520**

**3**

**AGN 601**

**4**

**AGN 717**

## AGN 430

FAO	400
Φυσιολογική ωρίμανση (μέρες)	112
Χρήση	Καρπός
Εδάφη που προτιμά	Όλα
Πληθυσμός ανά στρέμμα	8.300 φυτά (16x75εκ.)
Αρχική ανάπτυξη	Άριστη
Ύψος φυτού m	2,3 - 2,6 μέτρα
Γωνία φύλλων	Ορθόφυλλο
Stay green	Μέτριο
Αντοχή στην ξηρασία	Πολύ καλή
Σειρές ρόκας	16 - 18
Ειδικό βάρος καρπού	Πολύ υψηλό
Dry Down	Άριστο
Σταθερότητα αποδόσεων	Πολύ καλή
Σποροπαραγωγή	ΗΠΑ & Ιταλία

## AGN 520

FAO	620
Φυσιολογική ωρίμανση (μέρες)	124
Χρήση	Καρπός
Εδάφη που προτιμά	Όλα
Πληθυσμός ανά στρέμμα	7.800 φυτά (17x75εκ.)
Αρχική ανάπτυξη	Πολύ καλή
Ύψος φυτού m	2,4 - 2,7 μέτρα
Γωνία φύλλων	Ορθόφυλλο
Stay green	Μέτριο
Αντοχή στην ξηρασία	Πολύ καλή
Σειρές ρόκας	18 - 20
Ειδικό βάρος καρπού	Πολύ υψηλό
Dry Down	Πολύ καλό
Σταθερότητα αποδόσεων	Πολύ καλή
Σποροπαραγωγή	ΗΠΑ & Ιταλία



## AGN 601

FAO	640
Φυσιολογική ωρίμανση (μέρες)	126
Χρήση	Καρπός
Εδάφη που προτιμά	Όλα
Πληθυσμός ανά στρέμμα	8.300 φυτά (16x75εκ.)
Αρχική ανάπτυξη	Καλή
Ύψος φυτού m	2,5 - 2,8 μέτρα
Γωνία φύλλων	Ημιορθόφυλλο
Stay green	Μέτριο
Αντοχή στην ξηρασία	Πολύ καλή
Σειρές ρόκας	18 - 22
Ειδικό βάρος καρπού	Υψηλό
Dry Down	Άριστο
Σταθερότητα αποδόσεων	Πολύ καλή
Σποροπαραγωγή	ΗΠΑ & Ιταλία

---

## AGN 717

FAO	670
Φυσιολογική ωρίμανση (μέρες)	129
Χρήση	Καρπός & ενσίρωση
Εδάφη που προτιμά	Όλα
Πληθυσμός ανά στρέμμα	7.800 φυτά (17x75εκ.)
Αρχική ανάπτυξη	Πολύ καλή
Ύψος φυτού m	3,0 - 3,5 μέτρα
Γωνία φύλλων	Ορθόφυλλο
Stay green	Πολύ καλό
Αντοχή στην ξηρασία	Καλή
Σειρές ρόκας	18 - 20
Ειδικό βάρος καρπού	Πολύ υψηλό
Dry Down	Καλό
Σταθερότητα αποδόσεων	Πολύ καλή
Σποροπαραγωγή	ΗΠΑ & Ιταλία

# Λειμώνια Υψηλής Διατροφικής



## Enduro

Το Enduro είναι ένα μίγμα αγροστοδών αποτελούμενο από τρεις πολύ ποιοτικές ποικιλίες. Περιέχει 55% Festuca arundinacea, 30% Dactylis glomerata και 15% Lolium perenne. Προορίζεται για πολυετή χρήση και είναι κατάλληλο για βόσκηση, σανό και ενσίρωμα. Παρόμοια μείγματα χρησιμοποιούνται ευρέως για πρόβατα και αγελάδες στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία).

## Τα πλεονεκτήματα

Το Enduro είναι ιδιαίτερα εύγευστο για τα γαλακτοπαραγωγά ζώα σαν αποτέλεσμα της υψηλής πρόσληψης ξηράς ουσίας από αυτά. Η πρόσληψη ξηράς ουσίας με το Enduro είναι υψηλότερη και από αυτήν της μηδικής.

Η θρεπτική του αξία είναι πολύ υψηλή και η ενέργεια του συγκρινόμενη με αυτήν της μηδικής είναι κατά πολύ υψηλότερη με αποτέλεσμα να αυξάνει την παραγωγή γάλακτος.

Το Enduro περιέχει επίσης ικανή ποσότητα πρωτεϊνών. Κάτω από την κατάλληλη εδαφική διαχείριση, λίπανση και άρδευση το Enduro μπορεί να αποδώσει έως και 1500 κιλά ξηράς ουσίας ανά στρέμμα.

## Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικό φύτερωμα και γρήγορη εγκατάσταση μετά τη σπορά.
- Προσαρμογή σε όλους τους τύπους εδαφών.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Εξαιρετική αντοχή στην ξηρασία μετά την εγκατάστασή του.
- Καλή αντοχή στις ασθένειες.
- Γρήγορη αναβλάστηση μετά την κοπή ή την βόσκηση.

Περίοδος σποράς	Σεπτέμβριος - Οκτώβριος και Μάρτιος - Απρίλιος
Ποσότητα σπόρου	4 κιλά ανά στρέμμα
Βάθος σποράς	0,5 - 1 εκ.
Λίπανση	25 - 35 μονάδες N, 6 - 8 μονάδες P, 10 -14 μονάδες K ανά στρέμμα τον χρόνο
Κοπή	Όταν το χόρτο φθάσει τα 30 - 40 εκ., σ'αυτό το ύψος τα επίπεδα ενέργειας και πρωτεΐνης είναι στο μέγιστο.
Ύψος κοπής	6 - 8 εκ. από το έδαφος σε θερμές και υγρές συνθήκες. Δεν πρέπει να το κόβουμε κάτω από τα 8 εκ.
Βόσκηση	Ξεκινάμε την βόσκηση όταν το χόρτο είναι 15 -20 εκ. δεν πρέπει να το βοσκοίμε κάτω από τα 6 - 8 εκ.
Ενσίρωμα	Ενσιρώνουμε όταν το χόρτο φθάνει τα 20 - 25 εκ.

# 1

## ENDURO

# 2

## BARPECTRA II

# 3

## BARTEMPO

## Barspectra II

Μετά από 40 χρόνια συνεχούς παρουσίας της ποικιλίας Lolium Westerworld, Barspectra, στην ευρωπαϊκή αγορά, η BARENBRUG Ολλανδίας, παρουσιάζει με υπερηφάνεια την νέα βελτιωμένη ποικιλία Barspectra II.

Η Barspectra II είναι προϊόν της έρευνας των γενετιστών της BARENBRUG, οι οποίοι κατάφεραν να βελτιώσουν τα αγρονομικά και διατροφικά χαρακτηριστικά της φημισμένης ποικιλίας Barspectra.

Η Barspectra II έχει άριστη ποιότητα και παράγει εξαιρετικά εύγευστη χορτομάζα.

Η Barspectra II, είναι μία ποικιλία με φαρδύ φύλλο με υψηλή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα να παρέχει πολύ υψηλή απόδοση ξηράς χορτομάζας ανά στρέμμα.

Η Barspectra II, χαρακτηρίζεται από υψηλή πεπτικότητα για το ζώο, υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτείνες και είναι πλούσια σε διαλυτά σάκχαρα άρα και σε ενέργεια. Επιπλέον η νέα ποικιλία παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες, ιδιαίτερα στην σκωρίαση.

Η Barspectra II, είναι μία ποικιλία που δημιουργήθηκε ειδικά για χρήση στην νότια Ευρώπη και παράγει μία υψηλή πρώτη κοπή, αποτελώντας παράλληλα μία καλή λύση για την περίπτωση που θα ακολουθήσουν και άλλες κοπές στην ίδια σεζόν.

## Χαρακτηριστικά

- Γρήγορη ανάπτυξη μετά την σπορά και πυκνή ανάπτυξη
- Υψηλή απόδοση σε χορτομάζα στην πρώτη κοπή
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτείνη
- Πλούσια σε σάκχαρα
- Εξαιρετική αντοχή στην σκωρίαση
- Καλή αντοχή σε συνθήκες ξηρασίας
- Εξαιρετική αντοχή στο πλάγιασμα
- Η Barspectra II έδωσε τις υψηλότερες αποδόσεις σε ξηρά χορτομάζα σε δοκιμές στην Ιταλία και την Γαλλία.

Περίοδος σποράς	Σεπτέμβριος - Νοέμβριος
Μέθοδος σποράς	Με τις σπαρτικές των σιτηρών
Ποσότητα σπόρου	5 - 6 κιλά / στρέμμα

## Bartempo

Ετήσιο Λειμώνιο για Υψηλής Ποιότητας Ενσίρωμα.  
Η BARTEMPO είναι μια τετραπλοειδής ποικιλία Lolium multiflorum η οποία στοχεύει στην υψηλή απόδοση εύγευστης χορτομάζας. Η BARTEMPO είναι ένα λειμώνιο ευρείας προσαρμοστικότητας με σημαντική περιεκτικότητα ξηράς ουσίας στο φυτό γεγονός που διασφαλίζει υψηλή απόδοση σε ξηρά ουσία ανά στρέμμα.

## Χαρακτηριστικά

- Γρήγορη εγκατάσταση μετά την σπορά και πυκνή ανάπτυξη
- Γρήγορη αναβλάστηση την άνοιξη
- Εξαιρετική απόδοση σε ξηρά ουσία από την πρώτη κοπή
- Καλή αντοχή στον παγετό
- Πολύ καλή αντοχή στην σκωρίαση και στον βακτηριακό μαρασμό (Xanthomonas).
- Εξαιρετική αντοχή στο πλάγιασμα

### Η χρήση του BARTEMPO στην Νότια Ευρώπη:

Ιδανική εποχή σποράς	Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
Μέθοδος σποράς	Με σπαρτική σιτηρών
Πυκνότητα σποράς	5-6 κιλά/στρέμμα
Λιπάνση	
Αζωτο	Επιζητεί υψηλές αζωτούχες λιπάνσεις για υψηλές αποδόσεις
Φώσφορος	Ανάγκες, σύμφωνα με τις αναλύσεις εδάφους. Γενικά στα λειμώνια αρέσει η ικανοποιητική φωσφορούχος λιπάνση λόγω της ταχείας ανάπτυξης.
Κάλιο	Ανάγκες σύμφωνα με τις αναλύσεις εδάφους. Ιδανικό στάδιο συγκομιδής : Το στάδιο όπου εμφανίζονται τα πρώτα άνθη.

# Ποικιλίες Σιτηρών



# 1

## ALCIONE

Αλτσιόνε  
(Μαλακός σίτος)

# 2

## MAESTRALE

Μαεστράλε  
(Σκληρός σίτος)

### Χαρακτηριστικά Ποικιλιών

	ALCIONE	MAESTRALE
Διασταύρωση	D15/D29	IRIDE/SVEVO
Δημιουργία	PSB 2000	PSB2004
Απαιτήσεις για εαρινοποίηση	Υψηλές	Ανοιξιιάτικη ποικιλία
Ξεστάχιασμα	Μεσοπρώιμο	Πρώιμο
Ύψος φυτού	Μέτριο - κοντό	Μέτριο
Ειδικό βάρος καρπού	Υψηλό	Υψηλό
Χρώμα καρπού	Κόκκινο	-



## Alcione (Αλτσιόνε)

Ποικιλία μαλακού σίτου μικρού - μεσαίου ύψους (82 - 87 εκ.). Μεσοπρώιμη ποικιλία με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής. Πολύ καλή αντοχή στις κυριότερες μυκητολογικές ασθένειες: ωίδιο, καστανή - κίτρινη σκωρίαση. Παράγει αλεύρι καλής ποιότητας.

## Ποιότητα Καρπού

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη W	Μέτρια - Υψηλή 180 - 240
P/L	0,4 - 0,6
Τελική χρήση	Αλεύρι αρτοποιίας

## Καλλιέργεια

Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές ανάγκες για εαρινοποίηση και την υψηλή αντοχή στο κρύο συνιστάται πρώιμη σπορά. Πυκνότητα σποράς 18 - 20 κιλά /στρέμμα.

## Αζωτούχος λίπανση

Συνιστάται  
1/4 στην σπορά  
2/4 στο τέλος του αδελφώματος  
1/4 στο δεύτερο γόνατο

## Maestrале (Μαεστράλε)

Πολύ πρώιμη ποικιλία σκληρού σίτου με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής. Πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες. Καλής ποιότητας καρπό και με υψηλό δείκτη κίτρινων χρωστικών (B=24,5 - 26,5).

## Ποιότητα Καρπού

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη Δείκτης κίτρινων χρωστικών	Υψηλή Πολύ υψηλός B=24,5 - 26,5
Ποιότητα γλουτένης	Πολύ καλή

## Καλλιέργεια

Δεν απαιτείται πρώιμη σπορά. Πυκνότητα σποράς 18 - 20 κιλά/ στρέμμα. Αντοχή στις ασθένειες. Επειδή είναι ανοιξιότικη ποικιλία η σπορά μπορεί να γίνει από Οκτώβριο έως και αρχές Φεβρουαρίου. Πυκνότητα σποράς 18 - 20 κιλά /στρέμμα.

Για να εξασφαλιστεί υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και υψηλές αποδόσεις, απαιτεί πρόσθετη αζωτούχο λίπανση.

Έχει γενετική αντοχή στις κυριότερες ασθένειες.



# Ποικιλίες Μηδικής

**AMERICAN**  
genetics



**AGN M 68**

## Μηδική AGN M 68

Ποικιλία	AGN M 68
Αρχική προέλευση	Αμερική
Σποροπαραγωγή	Ιταλία
Συντελεστής λήθαργου	6,8
Τύπος	Μεσογειακός
Ανάπτυξη	Ημιόρθια - Όρθια, εύρωστη
Κοτσάνι	Λεπτό & κούφιο
Φύλλο	Οβάλ, μέσου μεγέθους
Λουλούδι	Μπλέ - λιλά
Αναβλάστηση	Ταχύτατη, παρόμοια μηδικών με συντελεστή 7,5
Ταχύτητα ξήρανσης	Πολύ καλή, λίγο πιο αργή των ντόπιων πληθυσμών
Προσαρμοστικότητα	Άριστη σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα
Αντοχή σε καύσωνα	Πολύ καλή
Αντοχή σε παγετό	Πολύ καλή - εξαιρετική
Αντοχή σε ασθένειες	Πολύ καλή σε Verticilium & Fusarium, και σε μορφές αφίδων
Μακροζωία	Πολύ καλή 4 - 5 χρόνια υψηλών αποδόσεων
Ποιότητα σανού	Πολύ καλή, με ποσοστό πρωτεϊνών πάνω από 20%
Παραγωγή	Πολύ υψηλή, άνω του 15% του Μ.Ο. των μαρτύρων.



# Ποικιλίες Σόγιας

**AMERICAN**  
genetics



**1**

**QUICK**

**2**

**TARGET**

## Quick

Μεσαίος κύκλος ανάπτυξης : ομάδα 1

Φυτό μέσης ανάπτυξης με εξαιρετική αρχική ανάπτυξη και άριστη αντοχή στις κυριότερες από παράσιτα προσβολές. Η ποικιλία αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται από ταχεία αποφύλλωση στο τέλος του κύκλου, διαθέτει δυνατό στέλεχος, ανθεκτικό στα πλαγιάσματα. Δημιουργεί πολλούς λοβούς άριστης παραγωγικής ικανότητας σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Συνιστάται επίσης και ως επίσπορη καλλιέργεια.

Προτεινόμενος πληθυσμός :

40-45 φυτά/τ.μ. για κανονική σπορά  
45-50 φυτά/τ.μ. ως επίσπορη καλλιέργεια.



## Target

Μέσο-όψιμος κύκλος ανάπτυξης: ομάδα 1+

Φυτό περιορισμένης ανάπτυξης, χαρακτηριστικό το οποίο μεγιστοποιεί την άριστη αντοχή του στα πλαγιάσματα, με εξαιρετική αρχική ανάπτυξη. Διακρίνεται για την ανθεκτικότητά του στις κυριότερες μυκητολογικές ασθένειες. Πρόκειται για μια ποικιλία με μεγάλες δυνατότητες, υψηλές αποδόσεις και ευρεία προσαρμοστικότητα.

Προτεινόμενος πληθυσμός :

40-45 φυτά/τ.μ. για κανονική σπορά.



# Υβρίδια Σόργου

**AMERICAN  
genetics**



**AGN PACIFIC  
GRAZE**


## AGN Pacific Graze

Αμερικάνικο υβρίδιο σόργου ειδικό για παραγωγή χλωρομάζας. Παράγει εξαιρετικής ποιότητας ζωοτροφή υψηλής θρεπτικής αξίας (14 – 20% πρωτεΐνες). Τα φυτά γίνονται υγιή, ψηλά και τα στελέχη είναι γλυκά, λεπτά και χυμώδη. Η αναβλάστηση είναι ταχύτατη. Οι βλαστοί του μπορεί να αυξηθούν μέχρι 7 cm την ημέρα. Η σπορά ξεκινά από το Μάρτιο και απαιτούνται 5 κιλά σπόρος/στρέμμα. Η πρώτη κοπή γίνεται περίπου 45 ημέρες μετά τη σπορά και μεταξύ των κοπών μεσολαμβάνουν περίπου 30 ημέρες. Κόβεται αφού τα φυτά περάσουν το 1,5 m ύψους και πριν την ανθοφορία. Το Pacific Graze έχει δείξει άριστη προσαρμοστικότητα στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Χρησιμοποιείται φρέσκο αλλά και για ενσίρωση. Δυνατότητα συνολικής παραγωγής μέχρι και 15 τόνους χλωρομάζας ανά στρέμμα.





# Υπεύθυνοι Πωλήσεων



## ΞΑΝΘΗ - ΡΟΔΟΠΗ - ΕΒΡΟΣ

Κάρρας Κωνσταντίνος / Τ. 6948549230  
k.karras@andriotis-seeds.gr

## ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ

Σφακιανός Ιωάννης / Τ. 6946502796  
g.sfakianos@andriotis-seeds.gr

## Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΠΕΛΜΑ - ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Ζαρογιάννης Βασίλειος / Τ. 6945592324  
v.zarogiannis@andriotis-seeds.gr

## ΠΙΕΡΙΑ - ΗΜΑΘΙΑ

Τσαχουρίδης Σωτήριος / Τ. 6946063996  
s.tsachouridis@andriotis-seeds.gr

## ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Κωλέτσης Αναστάσιος / Τ. 6948549229  
t.koletsis@andriotis-seeds.gr

## ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΙΩΤΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ράγκος Ιωάννης / Τ. 6946063995  
g.ragos@andriotis-seeds.gr

## ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Μακρής Ηλίας / Τ. 6945333458  
i.makris@andriotis-seeds.gr

## ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΦΑΡΣΑΛΑ

Πλατής Ηλίας / Τ. 6945592325  
i.platis@andriotis-seeds.gr

Κεντρικό: Αντώνη Τρίτση 15-17, Πυλαία - Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 20651, Τ.Κ. 55104  
Τηλ: 2310 900078, Φαξ: 2310 933395  
Αποθήκη Καλοχωρίου: Τηλ. 2310 574614

Γραφείο Λάρισας: Λαγού 6, 41222 Λάρισα  
Τηλ: 2410 626035, Φαξ: 2410 626034

**E-mail: [info@andriotis-seeds.gr](mailto:info@andriotis-seeds.gr)**





# Τιμοκατάλογος Προϊόντων

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
<b>ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ</b>		
DP 396 CRUISER®	ΣΑΚΟΣ 200ΜΚ	€ 120,00
DP 419 CRUISER®	ΣΑΚΟΣ 200ΜΚ	€ 120,00
DP 401 CRUISER®	ΣΑΚΟΣ 200ΜΚ	€ 120,00
<b>ΥΒΡΙΔΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ</b>		
AGN 430	ΣΑΚΟΣ 25ΜΚ	€ 42,00
	ΣΑΚΟΣ 25ΜΚ CRUISER®	€ 50,00
	ΣΑΚΟΣ 25ΜΚ PONCHO®	€ 54,00
AGN 520	ΣΑΚΟΣ 25ΜΚ	€ 42,00
	ΣΑΚΟΣ 25ΜΚ CRUISER®	€ 50,00
	ΣΑΚΟΣ 25ΜΚ PONCHO®	€ 54,00
AGN 601	ΣΑΚΟΣ 25ΜΚ	€ 42,00
	ΣΑΚΟΣ 25ΜΚ CRUISER®	€ 50,00
	ΣΑΚΟΣ 25ΜΚ PONCHO®	€ 54,00
AGN 717	ΣΑΚΟΣ 25ΜΚ	€ 42,00
	ΣΑΚΟΣ 25ΜΚ CRUISER®	€ 50,00
	ΣΑΚΟΣ 25ΜΚ PONCHO®	€ 54,00
<b>ΛΕΙΜΩΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ</b>		
ENDURO	ΣΑΚΟΣ 25 Kg	€ 112,50
BARSPECTRA II	ΣΑΚΟΣ 25 Kg	€ 62,50
BARTEMPO	ΣΑΚΟΣ 25 Kg	€ 62,50
<b>ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ</b>		
ALCIONE R1 IT	ΣΑΚΟΣ 50Kg	€ 62,50
ALCIONE R2 GR		€ 28,00
MAESTRALE R1 GR	ΣΑΚΟΣ 50Kg	€ 57,50
MAESTRALE R1 IT		€ 62,50
MAESTRALE R2 GR		€ 28,00
<b>ΜΗΔΙΚΗ</b>		
AGN M 68	ΣΑΚΙ 10Kg	€ 50,00
<b>ΣΟΓΙΑ</b>		
QUICK	ΣΑΚΙ 22,7 Kg	€ 40,00
TARGET	ΣΑΚΙ 22,7 Kg	€ 40,00
<b>ΥΒΡΙΔΙΟ ΣΟΡΓΟΥ</b>		
PACIFIC	ΣΑΚΙ 25Kg	€ 40,00

## Σημειώσεις

### Βαμβάκι

Οι σπόροι των ποικιλιών βαμβακιού είναι επενδεδυμένοι με εντομοκτόνο CRUISER® (Reg. Trademark of Syngenta Group Company). Παραγγελίες σπόρου βαμβακιού χωρίς επένδυση εντομοκτόνου γίνονται μόνον κατόπιν συνεννόησης έως της 30/11 της προηγούμενης χρονιάς.

### Καλαμπόκι

Οι σπόροι των υβριδίων καλαμποκιού είναι επενδεδυμένοι με εντομοκτόνα CRUISER® (Reg. Trademark of Syngenta Group Company) και PONCHO® (Reg. Trademark of Bayer Ag.Germany).



# Γενικοί Όροι Πωλήσεων

- Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο
- Οι τιμές και τα είδη του παρόντος τιμοκαταλόγου μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για τη διαρκή διαθεσιμότητα των ειδών του τιμοκαταλόγου. Τα είδη εκτός καταλόγου τιμολογούνται κατά περίπτωση κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη.
- Τα προϊόντα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό, με έξοδα και με κίνδυνο του αγοραστή.
- Τα εμπορεύματα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση και με τις προδιαγραφές των παραγωγών οίκων που υπερκαλύπτουν αυτές των ελληνικών νόμων. Περίπτωση αμφισβήτησεως ποιότητας νοείται μόνον γραπτώς και εντός τριών ημερών από την παραλαβή.
- Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν η αποζημίωση να υπερβαίνει την αξία του σπόρου, όπως προσδιορίζεται και από τις διεθνείς συμβάσεις F.I.S.
- Για οποιαδήποτε αντιδικία, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
- Οι περιγραφές προϊόντων, οδηγίες και πληροφορίες που παρέχονται από την εταιρία, έχουν ενδεικτική μόνο σημασία και ουδεμία αξίωση δύναται να στηριχθεί επ'αυτών. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της καλλιέργειας εξαρτώνται κατά βάση από τις καλλιεργητικές φροντίδες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Η εξόφληση τιμολογίων γίνεται εντός 30 ημερών.





Κεντρικό: Αντώνη Τρίτση 15-17, Τηλ: 2310 900078, Φαξ: 2310 933395  
Γραφείο Λάρισσας: Λαγού 6, Τηλ: 2410 626035, Φαξ: 2410 626034